



DU PONT®

**Acanto®**

**Acanto® käyttökohteen laajennus  
sokerijuurikaan tautien torjuntaan.  
Lupa voimassa 31.10.2017 asti.**



# Acanto® on hyväksytty

- juurikkaanhärmän (*Erysiphe betae*)
- juurikkaanruosteen (*Uromyces betae*)
- juurikkaanlehtilaikun (*ramularia* ja *cercospora*) tautien torjuntaan

## Käyttömäärät:

### Pohjavesialueella:

0,5 L/ha

kertaruiskutuksena

### Pohjavesialueiden ulkopuolella:

0,5 – 1 L/ha

kertaruiskutuksena

### jaettu käsittely

0,5 + 0,5 L/ha

Acanto® valmisteella on sekä suojaava että puhdistava vaikutus. Käsittely tehdään kasvuston umpeutumisen (BBCH 40) jälkeen, paras ruiskutushetki on ensimmäisten oireiden esiintyessä.

Acanto® käsittely tehdään viimeistään 42 vrk ennen sadonkorjuuta.

Tautipaineen ollessa pieni käytä alempia käyttömääriä ja tautipaineen ollessa suuri, suurempia käyttömääriä.

Acanto® on sateenkestävä aineen kuivuttua, yleensä 1-2 h ruiskutuksesta.

Vesimäärä sekä pohjavesialueilla että pohjavesialueiden ulkopuolella on 150-200 l/ha. Tiheässä kasvustossa kannattaa käyttää suurempaa vesimäärää 200 l/ha, täydellisen peittävyden varmistamiseksi

